

КОМБИСЕТ® от вредителей и болезней на ОВОЩАХ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ БАКОВОЙ СМЕСИ

ПРЕПАРАТ	ВРЕДНЫЙ ОБЪЕКТ/ НАЗНАЧЕНИЕ	РАЗВЕДЕНИЕ, л	РАСХОД РАБОЧЕГО РАСТВОРА	СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Имиприд®, 5 мл	Тля, трипсы, тепличная белокрылка	На 10 л воды	На 100 м²	Опрыскивание в период вегетации: Первое – профилактическое Последующие – с интервалом в 12–14 дней
Фамокс®, 6 г	Фитофтороз, альтернариоз			
АгроСтимул®, 2 мл	Ускорение наступления биологической и техно- логической зрелости; увеличение урожайности и качества продукции			

ПРИГОТОВЛЕНИЕ БАКОВОЙ СМЕСИ

1. В емкость объемом 10 л налить 5 л воды.
 2. Вскрыть упаковку «ИМИПРИД®, 5 мл», открыть ампулу, вылить водорастворимый концентрат в воду, тщательно перемешать до однородного состояния.
 3. Вскрыть упаковку «ФАМОКС®, 6 г», добавить гранулы в полученный раствор и размешать до однородного состояния.
 4. Вскрыть упаковку «АГРОСТИМУЛ®, 2 мл», открыть ампулу, добавить ее содержимое в полученный раствор и аккуратно размешать до однородного состояния.
 5. В емкость с полученным раствором добавить воды до полного объема (10 л) и еще раз тщательно размешать до однородного состояния.
- Раствор готов к применению. Использовать для обработки посадок овощей открытого и закрытого грунта согласно рекомендациям по использованию баковой смеси.

ЗАПРЕЩЕНО СМЕШИВАТЬ КОМПОНЕНТЫ ДАННОЙ БАКОВОЙ СМЕСИ
В ДРУГОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ!

СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ



Налить 5 л
воды



Вскрыть **ИМИПРИД®**,
добавить в воду,
тщательно перемешать



Вскрыть **ФАМОКС®**,
добавить в раствор,
тщательно перемешать



Вскрыть **АГРОСТИМУЛ®**,
добавить в раствор,
тщательно перемешать



Добавить воды
до объема 10 л,
тщательно перемешать,
опрыскать растения

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ОБРАБОТКЕ БАКОВЫМИ СМЕСЯМИ

- Готовую баковую смесь следует использовать в день ее приготовления
- Обработку нужно проводить в ясную безветренную погоду при температуре от +15 до +25 °C
- Обработки проводить ранним утром или поздним вечером
- Использовать мягкую чистую воду с нейтральным pH и температурой не менее +10 °C

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

- Проводить обработку при температуре воздуха выше +25 °C
 - Обрабатывать ослабленные растения
- Для достижения наилучшего результата рекомендуем применять баковую смесь четыре раза за период вегетации

Заказчик	Агрусхим-Алабуга	№ макета	13-25-05-26
Название	Инструкция Комбисет Овощи		
Обрезной формат	148x200		
Схема фальцовки №	23	Подготовил(а) макет	Евгения Приц
Согласовано и Утверждено			
Менеджер: Бойцова Лилия		Дата: 25.05.2026	
Заказчик:			
Внимание! Подпись заказчика под данным оригинал-макетом означает, что заказчик согласен с общим видом, текстом, размером, ориентацией. После утверждения заказчиком оригинал-макета типография не несет ответственности за грамматические и другие ошибки, которые могут присутствовать в оригинал-макете и отпечатанном тираже.			
ПРИМЕЧАНИЕ:			

КРАСКОСТЬ
(допуск по цвету ΔE ≤ 3, ISO 12647-2:2004)

Black

ДАННАЯ РАСПЕЧАТКА



НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЦВЕТОПРОБой

СХЕМА ФАЛЬЦОВКИ

Схема фальцовки
на странице 2

1^й фальц
148×200 —> 148×100

2^й фальц
148×100 —> 74×100

КОМБИСЕТ® от вредителей и болезней на ОВОЩАХ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ БАКОВОЙ СМЕСИ				
ПРЕПАРАТ	ВРЕДНЫЙ ОБЪЕКТ/ НАЗНАЧЕНИЕ	РАЗВЕДЕНИЕ, л	РАСХОД РАБОЧЕГО РАСТВОРА	СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Имиприд®, 5 мл	Тля, трипсы, тепличная белокрылка	На 10 л воды	На 100 м²	Опрыскивание в период вегетации.
Фамокс®, 6 г	Фитофтороз, альтернариоз			Первое — профилактическое
АгроСтимул®, 2 мл	Ускорение наступления биологической и технической зрелости; увеличение урожайности и качества продукции			Последующие — с интервалом в 12–14 дней

ПРИГОТОВЛЕНИЕ БАКОВОЙ СМЕСИ

1. В емкость объемом 10 л налить 5 л воды.

2. Вскрыть упаковку «ИМИПРИД®, 5 мл», открыть ампулу, вылить водорастворимый концентрат в воду, тщательно перемешать до однородного состояния.

3. Вскрыть упаковку «ФАМОКС®, 6 г», добавить гранулы в полученный раствор и размешать до однородного состояния.

4. Вскрыть упаковку «АГРОСТИМУЛ®, 2 мл», открыть ампулу, добавить ее содержимое в полученный раствор и аккуратно размешать до однородного состояния.

5. В емкость с полученным раствором добавить воды до полного объема (10 л) и еще раз тщательно размешать до однородного состояния.

Раствор готов к применению. Использовать для обработки посадок овощей открытого и закрытого грунта согласно рекомендациям по использованию баковой смеси.

ЗАПРЕЩЕНО СМЕШИВАТЬ КОМПОНЕНТЫ ДАННОЙ БАКОВОЙ СМЕСИ В ДРУГОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ!

СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ

Налить 5 л воды

Вскрыть **ИМИПРИД®**, добавить в воду, тщательно перемешать

Вскрыть **ФАМОКС®**, добавить в раствор, тщательно перемешать

Вскрыть **АГРОСТИМУЛ®**, добавить в раствор, тщательно перемешать

Добавить воды до объема 10 л, тщательно перемешать, опрыскивать растения

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ОБРАБОТКЕ БАКОВЫМИ СМЕСЯМИ

- Готовую баковую смесь следует использовать в день ее приготовления
- Обработку нужно проводить в ясную безветренную погоду при температуре от +15 до +25 °C
- Обработки проводить ранним утром или поздним вечером
- Использовать мягкую чистую воду с нейтральным pH и температурой не менее +10 °C

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

- Проводить обработку при температуре воздуха выше +25 °C
- Обрабатывать ослабленные растения

Для достижения наилучшего результата рекомендуем применять баковую смесь четыре раза за период вегетации

КОМБИСЕТ® от вредителей и болезней на ОВОЩАХ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ БАКОВОЙ СМЕСИ				
ПРЕПАРАТ	ВРЕДНЫЙ ОБЪЕКТ/ НАЗНАЧЕНИЕ	РАЗВЕДЕНИЕ, л	РАСХОД РАБОЧЕГО РАСТВОРА	СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Имиприд®, 5 мл	Тля, трипсы, тепличная белокрылка	На 10 л воды	На 100 м²	Опрыскивание в период вегетации.
Фамокс®, 6 г	Фитофтороз, альтернариоз			Первое — профилактическое
АгроСтимул®, 2 мл	Ускорение наступления биологической и технической зрелости; увеличение урожайности и качества продукции			Последующие — с интервалом в 12–14 дней

ПРИГОТОВЛЕНИЕ БАКОВОЙ СМЕСИ

1. В емкость объемом 10 л налить 5 л воды.

2. Вскрыть упаковку «ИМИПРИД®, 5 мл», открыть ампулу, вылить водорастворимый концентрат в воду, тщательно перемешать до однородного состояния.

3. Вскрыть упаковку «ФАМОКС®, 6 г», добавить гранулы в полученный раствор и размешать до однородного состояния.

4. Вскрыть упаковку «АГРОСТИМУЛ®, 2 мл», открыть ампулу, добавить ее содержимое в полученный раствор и аккуратно размешать до однородного состояния.

5. В емкость с полученным раствором добавить воды до полного объема (10 л) и еще раз тщательно размешать до однородного состояния.

Раствор готов к применению. Использовать для обработки посадок овощей открытого и закрытого грунта согласно рекомендациям по использованию баковой смеси.

Финальный размер
74×100 мм

КОМБИСЕТ® от вредителей и болезней на ОВОЩАХ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ БАКОВОЙ СМЕСИ		
ПРЕПАРАТ	ВРЕДНЫЙ ОБЪЕКТ/ НАЗНАЧЕНИЕ	РАЗВЕДЕНИЕ, л
Имиприд®, 5 мл	Тля, трипсы, тепличная белокрылка	На 10 л воды
Фамокс®, 6 г	Фитофтороз, альтернариоз	
АгроСтимул®, 2 мл	Ускорение наступления биологической и технической зрелости; увеличение урожайности и качества продукции	

ПРИГОТОВЛЕНИЕ БАКОВОЙ СМЕСИ

1. В емкость объемом 10 л налить 5 л воды.

2. Вскрыть упаковку «ИМИПРИД®, 5 мл», открыть ампулу, вылить водорастворимый концентрат в воду, тщательно перемешать до однородного состояния.

3. Вскрыть упаковку «ФАМОКС®, 6 г», добавить гранулы в полученный раствор и размешать до однородного состояния.

4. Вскрыть упаковку «АГРОСТИМУЛ®, 2 мл», открыть ампулу, добавить ее содержимое в полученный раствор и аккуратно размешать до однородного состояния.

5. В емкость с полученным раствором добавить воды до полного объема (10 л) и еще раз тщательно размешать до однородного состояния.

Раствор готов к применению. Использовать для обработки посадок овощей открытого и закрытого грунта согласно рекомендациям по использованию баковой смеси.

Заказчик

Агрусхим-Алабура

№ макета

13-25-05-26

Название

Инструкция Комбисет Овощи

Обрезной формат

148x200

Схема фальцовки №

23

Подготовил(а) макет

Евгения Приц

Согласовано и Утверждено

Подпись

Дата

Менеджер:

Бойцова Лилия

25.05.2026

Заказчик:

Внимание! Подпись заказчика под данным оригинал-макетом означает, что заказчик согласен с общим видом, текстом, размером, ориентацией. После утверждения заказчиком оригинал-макета типография не несет ответственности за грамматические и другие ошибки, которые могут присутствовать в оригинал-макете и отпечатанном тираже.

ПРИМЕЧАНИЕ:

КРАСОЧНОСТЬ

(допуск по цвету ΔE ≤ 3, ISO 12647-2:2004)

Биговка

Высечка

СХЕМА ФАЛЬЦОВКИ

Схема фальцовки

ДАННАЯ РАСПЕЧАТКА

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЦВЕТОПРОБой